
Kindergeneeskunde



Patiënteninformatie

Provocatietest koemelkallergie



Slingeland Ziekenhuis

Algemeen

De arts heeft een onderzoek met u afgesproken om vast te stellen of uw kind een koemelkallergie heeft.

Dit onderzoek heet voluit een dubbelblinde placebogecontroleerde voedselprovocatietest. In deze folder leest u meer informatie over dit onderzoek.

Het vaststellen van een koemelkallergie

Helaas bestaat er geen eenvoudige test die aan kan geven of uw kind inderdaad koemelkallergie heeft. Zelfs een allergietest (bloedonderzoek of huidtest) kan dit niet met zekerheid vaststellen. De enige manier om een koemelkallergie vast te stellen is door middel van een provocatietest.

Provocatietest

Het onderzoek houdt in dat uw kind op twee verschillende dagen testvoeding krijgt toegediend in het ziekenhuis. Op de ene dag krijgt uw kind testvoeding waarin koemelk zit, op de andere dag krijgt uw kind testvoeding zonder koemelk. De kinderverpleegkundige observeert hoe uw kind op de voeding reageert.

Om zonder vooroordeel te kunnen kijken naar de reactie van uw kind op de voeding, weten de arts, de kinderverpleegkundige en u niet op welke dag uw kind de testvoeding met koemelk of de testvoeding zonder koemelk krijgt. Dit noemt men 'dubbelblind onderzoek'. Deze manier levert de meest betrouwbare resultaten op.

Risico's

We besteden veel aandacht aan het beperken van de ernst van de reacties van uw kind op de voeding. We starten daarom met een kleine hoeveelheid voeding en geven steeds een beetje meer.

Kinderen kunnen verschillend reageren op voedingsmiddelen, zoals:

- huidverschijnselen als rode vlekjes, galbulten en eczeem;
- loopneus met niezen;
- piepen bij de in- en/of uitademing;
- maag-darmklachten, zoals acuut braken, diarree, krampen;
- algemene verschijnselen zoals dikke ogen of voedselweigering.

Toch bestaat een kleine kans dat er een forse reactie optreedt. Dit is de reden dat dit onderzoek in het ziekenhuis plaatsvindt. Wanneer er een ernstigere reactie optreedt, dan wordt dit direct behandeld. Soms zal de arts uit voorzorg een infuus inbrengen bij uw kind.

Vorbereiding

Vóór het onderzoek dient uw kind een koemelkvrij dieet te volgen. De arts geeft aan hoe lang van te voren u hiermee dient te starten. Uw kind mag absoluut geen koemelk (producten) eten of drinken, dit kan namelijk de uitslag van de test beïnvloeden. Geef uw kind ook geen eten of drinken dat het nog niet eerder gehad heeft. Pas na overleg met de arts kunt u het voorgeschreven dieet eventueel veranderen.

In onderstaand schema staan medicijnen die de uitslag van de test kunnen beïnvloeden. Als uw kind één van deze medicijnen gebruikt, dan dient u drie dagen voor het onderzoek te stoppen met het toedienen van deze medicatie aan uw kind.

Acrivastine	Cyclizine	Kestine	Periactin
Aerius	Cyproheptadine	Ketotifen	Polaramine
Alimemazine	Desloratidine	Levocabastine	Primatour
Allerfre	Dexchlorfeniramine	Levocetirizine	Promethazine
Allergodil	Dimetindeen	Livocab	Semprex
Astalin	Diphenhydramine	Loratidine	Suprimal
Astemizole	Ebastine	Mebhydroline	Tavegil
Atarax	Emadine	Meclozine	Telfast
Azelastine	Emedastine	Mistalin	Terfenadine
Benadryl	Emesafene	Mizolastine	Tinset
Cetirizine	Fenistil	Mizollen	Triludan
Chloorcyclizine	Fexofenadine	Navicalm	Xyzal
Cinnarizine	Hismanal	Nedeltran	Zaditen
Clematine	Hydroxyzine	Oxatomide	Zyrtec
Claritine	--	--	--

Op de dag van het onderzoek

- Smeer uw kind op de dag van het onderzoek niet in met hormoonzalf of een andere zalf/olie. Als uw kind ernstig eczeem heeft, kunt u in overleg met de arts wel smeren met hormoonzalf.
- Het is erg belangrijk dat uw kind tijdens de test goed eet/drinkt. Geef uw kind daarom 3 uren voor het onderzoek niets te eten of te drinken, alleen eventueel een beetje water. 's Morgens tot 06.30 uur kunt u uw kind eventueel een halve fles of een half ontbijt geven. Het halve ontbijt bestaat uit de helft van wat u uw kind normaal geeft.
- Neem eventueel een knuffel, slaapzakje, speen en/of eigen drinkfles mee.
- U kunt voor uzelf lunch van thuis meenemen of anders tegen betaling lunchen op de verpleegafdeling. U koopt de maaltijdbonnen bij de receptie in de centrale hal.

Afzeggen van het onderzoek

Voor het onderzoek is het belangrijk dat uw kind in goede lichamelijke conditie is. Het kan anders bij een reactie wellicht heftiger reageren. In sommige situaties is het verstandig te overleggen met de kinderverpleegkundige of kinderarts of de test kan doorgaan.

Neemt u contact op met kinderafdeling wanneer er sprake is van een situatie die vermeld staat in onderstaand schema:

In afgelopen 48 uur deze klacht(en) gehad:	In afgelopen 72 uur deze medicatie gebruikt:	In afgelopen 48 uur hogere dosering moeten innemen van:
<ul style="list-style-type: none">• Koorts (boven 38 °C) of;• Infectie (bijv. bovenste luchtweginfectie, maagdarminfectie) of;• Piepende ademhaling of;• Verergering van astma of;• Toename in eczeem of;• Maagdarmklachten (zoals misselijkheid, braken en diarree).	<ul style="list-style-type: none">• Antibiotica voor infecties	<ul style="list-style-type: none">• Atrovent® (=ipratropium)• Berodual®,• Bricanyl® (=terbutaline)• Flixotide® (=fluticason)• Oxis® (=formoterol)• Pulmicort® (=budesonide)• Qvar® (=beclomethason)• Seretide® (=flixotide + salmeterol)• Serevent® (=salmeterol)• Symbicort® (=budesonide + formoterol),• Ventolin®• Airomir (=Salbutamol)

Let op: wanneer uw kind bovenstaande medicatie dagelijks gebruikt, dan moet uw kind dit blijven doen. Alleen wanneer uw kind extra heeft moeten gebruiken, neemt u contact met ons op. De kinderafdeling is 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 92 96.

Het onderzoek

Uw kind wordt twee keer, op verschillende dagen, in het ziekenhuis opgenomen. Het onderzoek duurt per keer minimaal zes uur. Als er reacties optreden bij uw kind, kan het zijn dat uw kind langer in het ziekenhuis moet blijven voor observatie.

Op de dag van het onderzoek meldt u zich met uw kind op de afgesproken tijd op kinderafdeling B0. De kinderverpleegkundige die voor uw kind zorgt, verwelkomt u op de afdeling. Hij/zij controleert zo nodig eerst de temperatuur, bloeddruk, hartslag en ademhaling van uw kind. Tevens zal de kinderverpleegkundige een korte vragenlijst met u doornemen. Hierna begint de test.

U geeft uw kind testvoeding in zes of acht keer. Deze testvoeding ziet er precies hetzelfde uit als de voeding van thuis. Tussen de voedingen zit telkens 20 tot 30 minuten. Uw kind krijgt per keer een grotere hoeveelheid voeding. Na het geven van de laatste voeding, blijft uw kind nog minimaal twee uur in het ziekenhuis zodat wij kunnen observeren of er nog allergische reacties optreden.

De tijd tussen de twee opnamedagen is minimaal een week.

Na het onderzoek

Als de observatieperiode voorbij is, mag uw kind weer naar huis. U krijgt een formulier mee waarop u de eventueel optredende reacties bij uw kind kunt noteren. Wij verzoeken u dit formulier bij uw volgende bezoek aan het ziekenhuis weer mee te nemen.

Als uw kind binnen 48 uur na de test duidelijke klachten krijgt, dan dient u contact op te nemen met de arts/kinderverpleegkundige van het ziekenhuis op telefoonnummer (0314) 32 92 96. Deze zal u zo nodig vragen om op consult te komen.

Thuis dient u zich nog strikt aan het koemelkvrije dieet te houden tot en met de afspraak voor de uitslag.

Uitslag van het onderzoek

De uitslag van de test bespreekt de kinderarts met u tijdens de volgende afspraak op de polikliniek Kindergeneeskunde (begane grond, route 114). Afhankelijk van de testuitslag, spreekt de arts met u af om door te gaan met het koemelkvrije dieet of dat u hiermee kunt stoppen. U ontvangt hiervoor nadere mondelinge en schriftelijke richtlijnen.

Vragen

Bij vragen, twijfel en/of optredende reacties thuis, kunt u altijd contact met ons opnemen. Binnen kantooruren kunt u de polikliniek Kindergeneeskunde bellen op telefoonnummer (0314) 32 95 92. Buiten kantooruren kunt u bellen met de kinderafdeling op telefoonnummer (0314) 32 92 96.

Slingeland Ziekenhuis
Kruisbergseweg 25

Postadres:
Postbus 169
7000 AD Doetinchem

Telefoon: (0314) 32 99 11
Internet: www.slingeland.nl