

De coeliacusblokkade

Algemeen

In overleg met u is een afspraak gemaakt voor een coeliacusblokkade. Een anesthesioloog die gespecialiseerd is in pijnbestrijding verricht deze blokkade. Dit is meestal dezelfde anesthesioloog waarmee u de behandeling heeft afgesproken. Het kan voorkomen dat een andere anesthesioloog u behandelt. In deze folder leest u wat een coeliacusblokkade inhoudt en hoe de behandeling verloopt.

Een coeliacusblokkade

Bij een coeliacusblokkade blokkeert de anesthesioloog de pijn die wordt veroorzaakt door een tumor in de alvleesklier, maag en/of lever. De zenuwen die van deze organen afkomen, lopen door een zenuwnetwerk (plexus coeliacus). Dit zenuwnetwerk ligt achter in de buik, vlak voor de grote bloedvaten. Bij een coeliacusblokkade wordt dit zenuwnetwerk door het inspuiten van een vloeistof (alcohol in combinatie met pijnstilling) uitgeschakeld.

Vorbereiding

Om de behandeling goed te laten verlopen, is het belangrijk dat u zich goed voorbereidt:

- Gebruikt u bloedverdünnende medicijnen? Informeer uw anesthesioloog of pijnconsulent. Hij/ zij vertelt of u tijdelijk met deze medicijnen moet stoppen. Alle andere medicijnen mag u gewoon blijven gebruiken.
- Als u ziek bent of koorts heeft op de dag van de behandeling, kan de behandeling niet doorgaan. Neemt u contact met ons op voor het maken van een nieuwe afspraak.
- Als u allergisch bent voor pleisters, jodium, contrastvloeistof of medicijnen, meldt u dit dan vóór de behandeling.
- Als u zwanger bent (of zwanger denkt te zijn) moet u dat voor de behandeling melden aan de anesthesioloog. Tijdens de behandeling wordt met röntgenstraling gewerkt. Dit kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind.
- U mag na de behandeling de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Regel daarom van tevoren dat iemand u naar huis begeleidt.
- Voor deze behandeling moet u nuchter zijn. De pijnconsulent vertelt u vanaf wanneer u niet meer mag eten en drinken. Voor meer informatie over nuchter blijven kunt u de [nuchterkaart](#) bekijken.
- Heeft u diabetes? Dan dient u zeer waarschijnlijk uw medicatie aan te passen. Bent u bij uw huisarts onder controle voor suikerziekte, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts als u hier vragen over heeft. Bent u onder controle bij de internist, dan kunt u bellen met de diabetesverpleegkundige, telefoonnummer (0314) 32 96 69.

De behandeling

Naast de behandelend anesthesioloog en een sedatiespecialist is er ook een pijnconsulent aanwezig tijdens de behandeling. Zij assisteert de anesthesioloog. De pijnconsulent helpt u om de juiste houding aan te nemen op de behandeltafel. U ligt tijdens deze behandeling op uw buik.

De sedatiespecialist sluit u aan op bewakingsapparatuur om uw hartritme, bloeddruk en ademhaling te controleren. Vervolgens brengt hij/zij een infuusnaald in uw arm. Via dit infuus krijgt u pijnstilling en een rustgevend middel toegediend.

De anesthesioloog desinfecteert eerst uw huid. Daarna krijgt u een plaatselijk verdoving op de plek waar de naald wordt ingebracht. Dan plaatst hij/zij de naald in het zenuwnetwerk. Via de naald krijgt u contrastmiddel toegediend. De anesthesioloog kan dan op röntgenbeelden zien of de naald zich op de juiste plek bevindt. Zodra de naald in de juiste positie is gebracht, dient de anesthesioloog de vloeistof (alcohol en pijnstilling) toe. Dit kan kort warm aanvoelen in uw onderbuik. De behandeling duurt 20 tot 30 minuten.

Na de behandeling

Na afloop gaat u naar afdeling F2 of naar de afdeling waar u voor de behandeling verbleef. Hier kunt u rustig bijkomen. De anesthesioloog of pijnverpleegkundige komt voor uw vertrek naar huis nog bij u. Het is niet toegestaan dat u na de behandeling zelf naar huis rijdt.

Bijwerkingen en risico's

Na de behandeling kunt u last krijgen van de volgende complicaties/bijwerkingen:

- Een verlaagde bloeddruk. Via het infuus krijgt u vocht en eventueel medicatie.
- Het komt voor dat patiënten kortdurend last krijgen van diarree.

Wanneer contact opnemen

Neemt u direct contact op bij de volgende klachten:

- Een infectie (ontsteking) op de prikplaats. Een infectie herkent u aan koorts, roodheid en pijn. Dit komt zelden voor.
- Plotseling ongewild urineverlies (incontinentie) of moeite met plassen terwijl u daar voorheen geen problemen mee had.
- Plotseling optredende krachtverlies.

De polikliniek Pijnbestrijding is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur. U kunt de polikliniek bellen op telefoonnummer (0314) 32 92 42. Voor spoed is de polikliniek ook tussen 13.00 en 16.00 uur bereikbaar. Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met uw huisarts of huisartsenpost.

Meer informatie

Voor meer informatie over pijn en de polikliniek Pijnbestrijding van het Slingeland Ziekenhuis verwijzen wij u naar onze website <https://www.slingeland.nl/polikliniek-voor-pijnbestrijding>

Vragen

Heeft u vragen over de behandeling, dan kunt u de pijnconsulent bellen tijdens het telefonisch spreekuur.

Dit spreekuur is op dinsdag en vrijdag tussen 13.30 en 14.30 uur. De pijnconsulent is bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 97 99.

U kunt uw vraag ook stellen via een e-consult in Mijn Slingeland. U ontvangt doorgaans binnen 2 werkdagen een reactie.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder '[Uw rechten en plichten als patiënt](#)'. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.