
Kindergeneeskunde



Patiënteninformatie

Voorbereiding groeihormoon stimulatietest (meisje vanaf 20 kg)

Medicatieschema



Slingeland Ziekenhuis

Algemeen

Binnenkort krijgt uw kind een groeihormoon stimulatietest. Hiervoor moet uw kind drie dagen voor de test geslachtshormonen innemen. In deze folder leest u waarom dat is en vindt u het medicatieschema.

Geslachtshormonen

Wanneer uw kind de pre-puberteitsleeftijd (8-12 jaar) bereikt, worden er meer geslachtshormonen door het lichaam afgegeven. Deze hormonen hebben invloed op de afgifte van het groeihormoon en daarmee ook invloed op de uitslag van de test. Daarom krijgen meisjes vanaf 8 jaar drie dagen voor de test geslachtshormonen toegediend. U heeft hiervoor een recept meegekregen of het recept is digitaal naar uw apotheek verstuurd en dan liggen de medicijnen daar voor uw kind klaar.

Medicatieschema

Het medicijn dat uw kind krijgt is Progynova (17beta-oestradiol). Dit zijn tabletten van 2 mg. Uw kind neemt één keer per dag een tablet (2 mg) in. De tablet moet in één keer ingenomen worden na wat eten met een half glas water of in 1 lepel appelmoes of yoghurt. Niet kauwen op de tabletten, wanneer dit wel gebeurt wordt de kans op misselijkheid groter.

| Datum | Dag | Tijdstip | Medicijn (1 tablet = 2 mg) |
|-------|-----|----------------|-------------------------------|
| | 1 | 19:00 | 1 tablet |
| | 2 | 19:00 | 1 tablet |
| | 3 | 19:00 | 1 tablet |
| | 4 | TESTDAG | |

U kunt ervoor kiezen om het tijdstip van inname aan te passen naar 20:00 uur voor de gehele periode.

Slingeland Ziekenhuis
Kruisbergseweg 25

Postadres:
Postbus 169
7000 AD Doetinchem

Telefoon: (0314) 32 99 11
Internet: www.slingeland.nl